

일부 버콘-S 제품의 라벨표기사항 중 사용용법 '마'항 표기사항에 오류가 있어 다음과 같이 수정합니다.

수정 전: '마'항 - '버콘-에스 1kg 1봉지를 물 1L와 섞으면 100 배'

■ **용법 및 용량**

- 가. 소독대상물에 대하여 철저히 세척한 후 다음과 같이 소독을 실시한다.
- 나. 축사 내외부 소독 : m^2 당 희석액 200~300mℓ (평당 약 600~900mℓ)를 모든 표면이 충분하다. 축사기구의 세척 및 소독 : 분무대상 기구가 흠뻑 젖도록 분무한다.
- 라. 축사공간 소독 : $100m^3$ 당 희석액 1리터를 분무기로 축사공간에 고루 저압 연무 분무한다.
- 마. 희석방법 예시: **버콘-에스 1kg 1봉지를 물 1L와 섞으면 100배,** 물 200L와 섞으면 200배,



수정 후: '마'항 - '버콘-에스 1kg 1봉지를 물 100L와 섞으면 100 배'

■ **용법 및 용량**

- 가. 소독대상물에 대하여 철저히 세척한 후 다음과 같이 소독을 실시한다.
- 나. 축사 내외부 소독 : m^2 당 희석액 200~300mℓ (평당 약 600~900mℓ)를 모든 표면이 충분하다. 축사기구의 세척 및 소독 : 분무대상 기구가 흠뻑 젖도록 분무한다.
- 라. 축사공간 소독 : $100m^3$ 당 희석액 1리터를 분무기로 축사공간에 고루 저압 연무 분무한다.
- 마. 희석방법 예시: **버콘-에스 1kg 1봉지를 물 100L와 섞으면 100배,** 물 200L와 섞으면 200배,

제품에 관해 궁금하신 사항이 있으시거나 도움이 필요하실 경우 바이엘코리아 대리점 또는 바이엘수의컨설턴트에게 문의하시거나 고객센터(080-022-8590)로 연락주세요.